INSTRUCTIVO

1. Con la combinación CTRL+F O F3, buscar la pregunta que se desconozca, con el fin de ver si otro compañero ya la ha contestado.
2. En caso de que no, copiar y pegar la pregunta en duda, con sus posibles respuestas, para que el que la sepa pueda contestar
3. Si sabemos la respuesta a una pregunta, resaltar y en lo posible eliminar las opciones que no correspondan.

VERDE= 100% seguro

AMARILLO= capaz es esta

EXITOS!

¿Que estructura NO forma parte del Blastocisto?

a.

Hipoblasto

b.

Trofoblasto

c.

Blastocele

d.

Cavidad amniótica

n

Enunciado de la pregunta

Las células prenotocordales se intercalan en:

a.

Ninguna es correcta

b.

Hipoblasto

c.

Epiblasto

d.

Nódulo primitivo

Quitar mi elección

Pregunta **3**

Sin responder aún

Puntúa como 1

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Marque la opción CORRECTA con respecto al conducto Neuroentérico:

a.

Comunica la cavidad y el medio externo

b.

Se cierra el día 16

c.

Su cierre compromete el desarrollo del sistema circulatorio

d.

Permite el intercambio de sustancias- pa mi es esta si es esta

Del mesodermo intermedio se originan:

a.

Los somitas

b.

Los gononefrotomos

c.

Las hojas viscerales y esplácnica del mesodermo

d.

El tubo neural

ndique la opción CORRECTA con respecto al origen del sistema circulatorio:

a.

Ocurre el día 19 del grosor del amnios

b.

Ocurre el día 15 por migración epiblastica

c.

Ocurre el día 18 del mesodermo del saco vitelino

d.

Ocurre el día 21 del mesodermo intraembrionario

Con respecto al desarrollo embriológico del sistema nervioso, marque la opción CORRECTA:

a.

El mielencéfalo deriva del telencéfalo y origina el bulbo raquídeo

b.

El metencéfalo deriva del rombencéfalo y origina la protuberancia

c.

La neurulación es inducida por la notocorda

d.

El metencéfalo y el mielencéfalo poseen una cavidad común denominada cuarto ventrículo

ndique la opción CORRECTA con respecto al origen del sistema circulatorio:

a.

Ocurre el día 21 del mesodermo intraembrionario

b.

Ocurre el día 15 por migración epiblastica

c.

Ocurre el día 18 del mesodermo del saco vitelino

d.

Ocurre el día 19 del grosor del amnios

Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA con respecto al desarrollo embriológico del aparato respiratorio?

a.

La laringe deriva de la porción cefálica del esbozo laringotraqueal

b.

Las primeras 9 a 12 divisiones del brote broncopulmonar forman los bronquios segmentarios

c.

Durante la etapa alveolar el desarrollo del aparato respiratorio aparecen los neumonocitos I y II

d.

La etapa pseudoglandular se extiende desde la quinta semana a la semana 26 de vida intrauterina.

Indique la opción INCORRECTA con respecto a la glándula suprarrenal:

a.

Las células corticales se diferencian del mesodermo del epitelio celómico

b.

Al momento del nacimiento se encuentran bien definidas todas las capas de la corteza adrenal

c.

La médula adrenal se origina de las crestas neurales

d.

Durante la vida prenatal la corteza definitiva ya produce mineralocorticoides como glucocorticoides y la corteza transitoria andrógenos sexuales débiles

Marque la opción CORRECTA acerca del origen embriológico de las Células C o parafoliculares:

a.

Se originan a partir de la cara dorsal de las cuartas bolsas faríngeas

b.

Son células neuroectodermicas que migran transitoriamente hacia los cuerpos últimos branquiales

c.

Su relación con el esbozo tiroideo es inducida por el descenso del Timo

d.

Se originan del mesodermo

La nefrona deriva de:

a.

Pronefros

b.

Brote ureteral

c.

Mesodermo del metanefros

d.

Mesonefro

Marque la opción INCORRECTA con respecto al desarrollo del aparato urinario:

a.

El trígono vesical está formado por la desembocadura de los conductos de Wolff y de los uréteres en la vejiga

b.

El mesodermo de la periferia del metanefros forma la capsula del riñón

c.

La uretra peneana tiene una pequeña porción distal de origen ectodérmico

d.

El brote ureteral es una evaginación hueca que deriva del metanefros

Cuales de los siguientes elementos forman parte del desarrollo embriológico del hígado?

a.

Brote hepático del endodermo

b.

Septum transverso y venas vitelinas

c.

Ninguna es correcta

d.

Todas son correctas

Que estructura NO participa en el desarrollo del periodo indiferenciado?

a.

Conductos de Müller

b.

Seno urogenital

c.

Crestas genitales

d.

Cresta urogenital

¿En que semana aparecen los rebordes mamarios?

a.

Séptima semana

b.

Quinta semana

c.

Novena semana

d.

Sexta semana

Cual es el origen embriológico de las trompas de Falopio?

a.

De un prolongación de las gónadas primitivas

b.

De las es fucionadaaaas

d.

De la fusión de los conductos de Müller

Marque la opción INCORRECTA con respecto al desarrollo del aparato urinario:

a.

El trígono vesical está formado por la desembocadura de los conductos de Wolff y de los uréteres en la vejiga

b.

El mesodermo de la periferia del metanefros forma la capsula del riñón

c.

La uretra peneana tiene una pequeña porción distal de origen ectodérmico

d.

El brote ureteral es una evaginación hueca que deriva del metanefros

¿Que estructura NO participa en el desarrollo del periodo indiferenciado?

a.

Conductos de Müller

b.

Seno urogenital

c.

Crestas genitales

d.

Cresta urog enital